

# Lanche Clínico II

## Plano de Contingência - EBOLA

Setembro 2014

Equipe SCIH:

Dr<sup>a</sup>. Regina Tranches

Dr. Antonio Pignatari

Enf<sup>a</sup>. Angela Sola


Enf<sup>a</sup>. Fabiana Vasques



## TRIAGEM

### Caso Suspeito

- ✓ Febre **ou** manifestações hemorrágicas + contato com caso suspeito nos últimos 21 dias;  
OU
- ✓ Febre **ou** manifestações hemorrágicas + proveniente de área endêmica (Guiné, Libéria, Serra Leoa, Nigéria e Senegal), nos últimos 21 dias.  
OU
- ✓ Profissional da saúde proveniente de área endêmica (Guiné, Libéria, Serra Leoa, Nigéria e Senegal) .



1. Paciente encaminhado para o consultório 8;
2. Avaliação e confirmação de caso suspeito pelo médico do PS;
3. Confirmado: acionar o SAMU e transferir paciente para o leito 5 da UTI8




### MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

**Isolamento do paciente:** precaução de contato, isolamento individual;

**Medias de precaução para o profissional da saúde:** EPI para isolamento de contato que contemple toda a superfície corpórea (macacão, máscara N95, viseira facial e duas luvas de procedimento).

**Limpeza do Ambiente:** hipoclorito.

**Resíduo:** descarte e transporte separados e identificados.



## ATENDIMENTO

**Laboratorial:** NÃO COLETAR NENHUM EXAME DO PACIENTE

**Atendimento:** Acomodar o paciente no leito 5 da UTI do 8º andar até ser transferido para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

O atendimento deste paciente deve ser exclusivamente realizado por um médico e um enfermeiro. Os mesmos deverão permanecer na ante sala paramentados até remoção do paciente.

**Acompanhamento do paciente:** suporte clínico para febre hemorrágica



### TRANSFERÊNCIA

O paciente deve ser transportado com macacão impermeável (o mesmo tipo usado pelo colaborador) e máscara comum, pelos elevadores 01 ou 02 apenas, até a ambulância.

O SAMU é o meio de transporte referência. Disque 192

**Hospital de referência:** Instituto de Infectologia Emilio Ribas.



# Modo de VESTIR os EPIs

**1** Atendimento caso suspeito de EBOLA Medidas de Precauções

**Modo de VESTIR os EPIs**

**Profissional que irá utilizar os EPIs**

- ✓ Limpar o atendimento ao enfermeiro e médico;
- ✓ Colaboração da governança, por escrito.

**Tipos de EPIs necessários**

- ✓ 2 pares de luvas de procedimento;
- ✓ 1 máscara N95;
- ✓ 1 conjunto de roupa privativa;
- ✓ 1 recapeção de mangas-longo e touca impermeável;
- ✓ 1 visor facial;
- ✓ 1 protetor de calçado impermeável;
- ✓ 2 par de botas de bota-chá.

**Na conforto médico ou vestiário da unidade**

21 Retirar todos os acessórios pessoais, pulseiras, anéis, aliança, relógio, ...

22 Trocar a roupa pessoal pelo conjunto de roupa privativa (calça e blusa).



**23** Equipamento de Procedimento

**Nome:** Centro de Diagnóstico (CD) / Departamento de Diagnóstico Laboratorial / Instituto de Saúde Especial

**Endereço:** Avenida Itália, 1088 / Data: 14/06/2014 / Versão: 01

**2** Atendimento caso suspeito de EBOLA Medidas de Precauções

**Modo de VESTIR os EPIs**

**Na conforto médico ou vestiário da unidade:**

24 Retirar os sapatos e vestir o protetor de calçado impermeável, colocando-o por fora da calça.

25 Higienizar as mãos (água e sabão ou álcool gel).

**Na ante sala do quarto do paciente:**

26 Colocar a máscara N95 devidamente ajustada a sua face, cobrindo totalmente o nariz e boca.

27 Vestir o primeiro par de luvas.






**28** Equipamento de Procedimento

**Nome:** Centro de Diagnóstico (CD) / Departamento de Diagnóstico Laboratorial / Instituto de Saúde Especial

**Endereço:** Avenida Itália, 1088 / Data: 14/06/2014 / Versão: 01

**3** Atendimento caso suspeito de EBOLA Medidas de Precauções

**Modo de VESTIR os EPIs**

**Na ante sala do quarto do paciente:**

29 Vestir o recapeção de mangas-longo com o fechamento para a frente e ajustar e touca cobrindo todo o crânio e parte da testa.

30 Vestir as botas e colocá-las por dentro do recapeção deixando apenas a parte dos pés expostos de fora.

31 Colocar a visor facial, ajustado para o ajuste adequado na cabeça permitindo que a mesma não caia no momento do procedimento.





**32** Equipamento de Procedimento

**Nome:** Centro de Diagnóstico (CD) / Departamento de Diagnóstico Laboratorial / Instituto de Saúde Especial

**Endereço:** Avenida Itália, 1088 / Data: 14/06/2014 / Versão: 01

**4** Atendimento caso suspeito de EBOLA Medidas de Precauções

**Modo de VESTIR os EPIs**

**Na ante sala do quarto do paciente:**

33 Colgar o segundo par de luvas, cobrindo-a e torção por fora do macacão.

**Agora você está protegido para entrar no quarto.**





**34** Equipamento de Procedimento

**Nome:** Centro de Diagnóstico (CD) / Departamento de Diagnóstico Laboratorial / Instituto de Saúde Especial

**Endereço:** Avenida Itália, 1088 / Data: 14/06/2014 / Versão: 01



# Modo de RETIRAR os EPIs

**1** Atendimento caso suspeito de EBDOLA  
Medidas de Precauções

**Atenção**  
Os passos para a retirada dos EPIs incluem identificação com soluções abrasivas (hipoclorito de sódio a 1%) e manter as mãos com água e sabão.

**Modo de RETIRAR os EPIs**

**Na sala do paciente**

1# Lavar as mãos com as lavas filtrantes água e sabão.

2# Realizar desinfecção de mãos (mangas, cotos e punhos) e botas, pulverizando hipoclorito em grande quantidade.

3# Realizar desinfecção das lavas externas.

4# Remover as lavas externas, atentando para não retirar a inferior e descartá-la em resíduo infectante.

**Fonte:**  
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  
Hospital de Referência de São Paulo

**Revisão:** Brasília, 12/04/2014  
Data: 14/04/2014  
Versão: 02

**2** Atendimento caso suspeito de EBDOLA  
Medidas de Precauções

**Modo de RETIRAR os EPIs**

**Na antecâmara do quarto do paciente**

5# Retirar a viseira passando-a para frente e para cima. Descartá-la em resíduo infectante.

6# Remover a touca do nascido segurando na parte de trás e para trás.

7# Remover a máscara N95 segurando pela parte externa da máscara e engendrando-a para atrás da cabeça e descartá-la em resíduo infectante.

**Fonte:**  
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  
Hospital de Referência de São Paulo

**Revisão:** Brasília, 12/04/2014  
Data: 14/04/2014  
Versão: 02

**3** Atendimento caso suspeito de EBDOLA  
Medidas de Precauções

**Modo de RETIRAR os EPIs**

**Na antecâmara do quarto do paciente**

8# Abrir o zíper da máscara evitando para não prender a trava.

9# Remover prioritariamente o mascado dos ombros, segurando pela parte externa do mascado.

10# Remover as mangas segurando pela parte externa do mascado e passando-as uma de cada vez. Cuidado para não renovar as lavas.

**Fonte:**  
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  
Hospital de Referência de São Paulo

**Revisão:** Brasília, 12/04/2014  
Data: 14/04/2014  
Versão: 02

**4** Atendimento caso suspeito de EBDOLA  
Medidas de Precauções

**Modo de RETIRAR os EPIs**

**Na antecâmara do quarto do paciente**

11# Abaixar o mascado do restante do corpo, evitando qualquer movimento.

12# Retirar o restante do mascado puxando-o até que seja removido por completo. Descartar o mascado em resíduo infectante.

13# Descartar o mascado no fecho de infectante. Levantá-lo para pegá-lo do chão pelo lado inferior. Este mascado não será reaproveitado, o uso do fecho é apenas para facilitar o descarte correto, uma vez que ocupará muito espaço na base de coleta.

**Fonte:**  
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  
Hospital de Referência de São Paulo

**Revisão:** Brasília, 12/04/2014  
Data: 14/04/2014  
Versão: 02



# Modo de RETIRAR os EPIs

**5**

## Atendimento caso suspeito de EBOLA Medidas de Precauções



### Modo de RETIRAR os EPIs

#### Entre ante sala e o corredor da unidade

**148** Remover a primeira bota com o auxílio do outro pé, próximo a porta da ante sala para o corredor da unidade. Assim que retirar a primeira bota pisar para fora da ante sala com o pé vestida pelo protetor de calçado impermeável.



**150** Remover a segunda bota com o auxílio das mãos ainda com as luvas, segurando na parte externa. Ao retirar a bota pisar para fora da ante sala com o pé vestida pelo protetor de calçado impermeável.



EPIs e Equipamentos de Proteção Individual

**149** Descartar as botas no **hopper** infectante.



**179** Remover o par de luvas virando pelo avesso e descartá-lo no resíduo infectante da ante sala.



Foto:  
Camilla (Campe) Castro (CCO)  
Higienização Manual (MUN) (M)  
Ministério de Saúde (MS)

Revisão Técnica (RTM)  
Data: 14/08/2014  
Versão: 02

**6**

## Atendimento caso suspeito de EBOLA Medidas de Precauções



### Modo de RETIRAR os EPIs

#### Fora da ante sala

**188** Higienizar as mãos com água e sabão no pia da corredor.



#### No conforto ou vestiário da unidade

**189** Dirigir-se ao conforto e remover a roupa íntima e o protetor de pé impermeável descartando-os em resíduo infectante. Deixar um **hopper** com saco infectante no conforto ou vestiário da unidade.

EPIs e Equipamentos de Proteção Individual

Foto:  
Camilla (Campe) Castro (CCO)  
Higienização Manual (MUN) (M)  
Ministério de Saúde (MS)

Revisão Técnica (RTM)  
Data: 14/08/2014  
Versão: 02

#### OBSERVAÇÕES

- ✓ Este procedimento de vestir e retirar os EPIs deverá ser realizado todas as vezes em que for necessário entrar ou sair da ante sala para qualquer outra dependência da unidade;
- ✓ Atentar as necessidades de sair da ante sala;
- ✓ Quanto menos vezes colocar e retirar os EPIs menor será o risco de contaminação.





# INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

HOSPITAL NOVE DE JULHO intranet

SEMANA DE E CAPTAÇÃO

DE 22 a PALESTRAS E PARTI

Menu intranet

- » Home
- » D.H.J.
- » Assistência Farmacêutica
- » JCI
- » BIP
- » **COH**
- » Centro de Estudos
- » Comercial
- » Direto da Fonte
- » Diretoria Médica

direto da FONTE

EM DIA

Comunicados Im

SEMANA DE E CAPTAÇÃO

- » Mapa de Bactérias Multiresistentes
- » Normas / Rotinas
- » **Piano de Contingencia Ebola**
- » Riscos de Agravos e Ameaças para Copa do Mundo 2014
- » Tabelas de Precauções Específicas para Doenças
- » Manual de Antibióticoprofilaxia Cirúrgica



# INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

## Menu intranet

» Home

» O H9J

» Assistência Farmacêutica

» JCI

» BIP

» CCIH

• Cuidados no uso de EPI'S - Ebola

Download

• Precauções para Atendimento - Caso Suspeito de Ebola

Download

• Recomendações para prevenção de transmissão de Ebola

Download



HOSPITAL  
**NOVE**  
DE JULHO

**Obrigada!**

